

HERVORRAGENDE DESINFEKTION NACH DEM MELKEN

AUXILIUM® BARRIER

KOMPONENTE 1 - BASE:

Leicht viskose, klare Flüssigkeit. Nur mit **AUXILIUM® Barrier** Komponente 2 mischen.

Wirkstoff: Natriumchlorit. Nach Mischung mit Komponente 2 (Milchsäure) entsteht Chlordioxid. Dieses Biozid-Produkt ist registriert unter Nummer N-27883, Produktart 3 (PT3).

AUXILIUM® Barrier wird zur Desinfektion der Zitzen nach dem Melken eingesetzt und hinterlässt eine filmbildende Schicht auf der Zitzenhaut, die den Strichkanal vor negativen Einflüssen von außen schützt. **AUXILIUM® Barrier** sorgt durch seine hautpflegenden Komponenten für eine geschmeidige Zitzenhaut.

WARNUNG: Von Kindern fernhalten. Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden. Nicht in die Augen bringen. Bei eventuellem Kontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und bei Augenreizung einen Arzt aufsuchen. Nach verschlucken reichlich Wasser nachtrinken, sofort Frischluft zuführen und unverzüglich einen Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen sofort Frischluft zuführen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser abwaschen. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht zum Reinigen von Melkgeschirren verwenden.

VORSICHT: Nur zur äußeren Desinfektion von Zitzen nach dem Melken. Bei Frost die Kühe solange drinnen halten, bis die Zitzen vollständig trocken sind. Nur mit **AUXILIUM® Barrier** Komponente 2 mischen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

HERSTELLUNG DER GEBRAUCHSLÖSUNG:

AUXILIUM® Barrier Komponente 1 und Komponente 2 zu gleichen Teilen in das untere Dipbecherteil pumpen. Gut schütteln bis eine gleichmäßige goldene Farbe entsteht. Nicht verdünnen. Bitte beachten Sie, dass nur soviel **AUXILIUM®** angemischt wird, wie für einen Melkgang (von 2,5 - 3 Stunden) notwendig ist. Sollte ein Melkgang die Zeit

Rückseite **AUXILIUM® Barrier** Komponente 2 - AKTIVATOR >>>

Die schnell wirkende 2-Komponenten Zitzendesinfektionslösung mit **Barriereschutz**



von 3 Stunden überschreiten, muss erneut eine frische Gebrauchslösung hergestellt werden. Pro Kuh werden durchschnittlich 6-7 ml benötigt. Vor jedem Melken eine neue Mischung zubereiten. Dipober- und Dipunterbecher nach jedem Melkgang ausspülen.

ANWENDUNG: Die Zitzen direkt nach jedem Melkgang mindestens bis zur Hälfte in **AUXILIUM® Barrier** Gebrauchslösung in den Dipbecher tauchen. **NICHT ABREIBEN.** Immer frisch angemischtes, vollkonzentriertes **AUXILIUM® Barrier** Dipmittel verwenden. Wenn Produkt im Dipbecher sichtbar verschmutzt ist, Inhalt entsorgen und mit frischem **AUXILIUM® Barrier** Dipmittel auffüllen. Vor dem nächsten Melken Zitzen gründlich gemäß ordentlicher Verfahren reinigen. Einfaches Papiertuch zum Trocknen verwenden.

LAGERUNG: Frost vermeiden. Frost beeinträchtigt jedoch nicht die Wirksamkeit dieses Produkts, wenn die gefrorenen Inhalte aufgetaut und ordentlich geschüttelt wurden, bevor Komponente 1 (Base) und Komponente 2 (Aktivator) gemischt werden. Bei Zimmertemperatur lagern. Vor Hitze und Sonnenlicht schützen.

PFLEGETIPP: Verschmutzte Zitzen mit Leitungswasser reinigen und mit einem Einwegpapiertuch abtrocknen. Bei Frost oder großer Kälte die Tiere drinnen halten, bis die Zitzen völlig abgetrocknet sind.

HINWEIS FÜR DEN NUTZER: Die goldene Farbe in dem gemischten Produkt verblasst mit der Zeit. Bei höheren Temperaturen geht das Verblasen schneller vonstatten; dies beeinflusst jedoch nicht die Wirksamkeit des Produkts.



ACHTUNG! BIOZID. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bestellen Sie unsere Qualitätsprodukte online:

www.agribox-shop.com



AGRIBOX®

HERVORRAGENDE DESINFEKTION NACH DEM MELKEN

AUXILIUM® BARRIER

Die schnell wirkende
2-Komponenten
Zitzendesinfektionslösung
mit **Barriereschutz**



KOMPONENTE 2 - AKTIVATOR:

Leicht bewegliche, gelbliche Flüssigkeit. Nur mit **AUXILIUM® Barrier** Komponente 1 mischen.

Wirkstoff: Milchsäure. Nach Mischung mit Komponente 1 (Natriumchlorit) entsteht Chlordioxid. Dieses Biozid-Produkt ist registriert unter Nummer N-27883, Produktart 3 (PT3).

AUXILIUM® Barrier wird zur Desinfektion der Zitzen nach dem Melken eingesetzt und hinterlässt eine filmbildende Schicht auf der Zitzenhaut, die den Strichkanal vor negativen Einflüssen von außen schützt. **AUXILIUM® Barrier** sorgt durch seine hautpflegenden Komponenten für eine geschmeidige Zitzenhaut.

WARNUNG: Von Kindern fernhalten. Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden. Nicht in die Augen bringen. Bei eventuellem Kontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und bei Augenreizung einen Arzt aufsuchen. Nach verschlucken reichlich Wasser nachtrinken, sofort Frischluft zuführen und unverzüglich einen Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen sofort Frischluft zuführen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser abwaschen. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht zum Reinigen von Melkgeschirren verwenden.

VORSICHT: Nur zur äußeren Desinfektion von Zitzen nach dem Melken. Bei Frost die Kühe solange drinnen halten, bis die Zitzen vollständig trocken sind. Nur mit **AUXILIUM® Barrier** Komponente 1 mischen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

HERSTELLUNG DER GEBRAUCHSLÖSUNG:

AUXILIUM® Barrier Komponente 1 und Komponente 2 zu gleichen Teilen in das untere Dipbecherteil pumpen. Gut schütteln bis eine gleichmäßige goldene Farbe entsteht. Nicht verdünnen. Bitte beachten Sie, dass nur soviel **AUXILIUM®** angemischt wird, wie für einen Melkgang (von 2,5 - 3 Stunden) notwendig ist. Sollte ein Melkgang die Zeit

von 3 Stunden überschreiten, muss erneut eine frische Gebrauchslösung hergestellt werden. Pro Kuh werden durchschnittlich 6-7 ml benötigt. Vor jedem Melken eine neue Mischung zubereiten. Dipober- und Dipunterbecher nach jedem Melkgang ausspülen.

ANWENDUNG: Die Zitzen direkt nach jedem Melkgang mindestens bis zur Hälfte in **AUXILIUM® Barrier** Gebrauchslösung in den Dipbecher tauchen. **NICHT ABREIBEN.** Immer frisch angemischtes, vollkonzentriertes **AUXILIUM® Barrier** Dipmittel verwenden. Wenn Produkt im Dipbecher sichtbar verschmutzt ist, Inhalt entsorgen und mit frischem **AUXILIUM® Barrier** Dipmittel auffüllen. Vor dem nächsten Melken Zitzen gründlich gemäß ordentlicher Verfahren reinigen. Einfaches Papiertuch zum Trocknen verwenden.

LAGERUNG: Frost vermeiden. Frost beeinträchtigt jedoch nicht die Wirksamkeit dieses Produkts, wenn die gefrorenen Inhalte aufgetaut und ordentlich geschüttelt wurden, bevor Komponente 1 (Base) und Komponente 2 (Aktivator) gemischt werden. Bei Zimmertemperatur lagern. Vor Hitze und Sonnenlicht schützen.

PFLEGETIPP: Verschmutzte Zitzen mit Leitungswasser reinigen und mit einem Einwegpapiertuch abtrocknen. Bei Frost oder großer Kälte die Tiere drinnen halten, bis die Zitzen völlig abgetrocknet sind.

HINWEIS FÜR DEN NUTZER: Die goldene Farbe in dem gemischten Produkt verblasst mit der Zeit. Bei höheren Temperaturen geht das Verblasen schneller vonstatten; dies beeinflusst jedoch nicht die Wirksamkeit des Produkts.

Rückseite **AUXILIUM® Barrier** Komponente 1 - BASE >>>



AUXILIUM® Barrier Gebrauch 01/2023

ACHTUNG! BIOZID.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

AGRIBOX GmbH

OT Radensdorf
An der B320 Nr. 1
D-15907 Lübben (Spreewald)
T: +49 (0)3546 - 22533-0
F: +49 (0)3546 - 22533-99

Gebührenfrei:
T: 00800 - 2474 2698
F: 00800 - 2474 2693
www.agribox.com
info@agribox.com